

# Интегралы и дифференциальные уравнения

Рубежный контроль  
2 семестр | Модуль №2

GitHub: malyinik

2024 г.

# Содержание

<b>1</b>	<b>Теоретические вопросы, оцениваемые в 1 балл</b>	<b>2</b>
1.1	Сформулировать определение общего решения ОДУ $n$ -го порядка . . . . .	2
1.2	Сформулировать определение задачи Коши для ОДУ $n$ -го порядка . . . . .	2
1.3	Сформулировать определение линейного ОДУ $n$ -го порядка . . . . .	2
1.4	Сформулировать определение линейной зависимости и линейной независимости системы функций на промежутке . . . . .	3
1.5	Сформулировать определение определителя Вронского системы функций . .	3
1.6	Сформулировать определение фундаментальной системы решений линейного однородного ОДУ . . . . .	3
1.7	Сформулировать определение характеристического уравнения линейного ОДУ с постоянными коэффициентами . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Теоретические вопросы, оцениваемые в 3 балла</b>	<b>4</b>
2.1	Сформулировать и доказать теорему о вронскиане системы линейно зависимых функций . . . . .	4
2.2	Сформулировать и доказать теорему о вронскиане системы линейно независимых частных решений линейного однородного ДУ . . . . .	5
2.3	Сформулировать и доказать теорему о существовании фундаментальной системы решений линейного однородного ДУ $n$ -го порядка . . . . .	6
2.4	Сформулировать и доказать теорему о структуре общего решения линейного однородного ДУ $n$ -го порядка . . . . .	8
2.5	Сформулировать и доказать теорему о структуре общего решения линейного неоднородного ДУ $n$ -го порядка . . . . .	10
2.6	Сформулировать и доказать теорему о наложении (суперпозиции) частных решений линейного неоднородного ОДУ . . . . .	11
2.7	Сформулировать и доказать свойства частных решений линейного однородного ДУ . . . . .	13
2.8	Вывести формулу Остроградского - Лиувилля для линейного ОДУ 2-го порядка . . . . .	15
2.9	Вывести формулу для общего решения линейного однородного ДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами в случае простых действительных корней характеристического уравнения . . . . .	16
2.10	Вывести формулу для общего решения линейного однородного ОДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами в случае комплексных корней характеристического уравнения . . . . .	16
2.11	Вывести формулу для общего решения линейного однородного ОДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами в случае кратных корней характеристического уравнения . . . . .	17
2.12	Описать метод Лагранжа вариации произвольных постоянных для линейного неоднородного ОДУ 2-го порядка и вывести систему соотношений для варьируемых переменных . . . . .	18

# 1 Теоретические вопросы, оцениваемые в 1 балл

## 1.1 Сформулировать определение общего решения ОДУ n-го порядка

$$\left\{ \begin{array}{l} y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_{10} \\ y''(x_0) = y_{20} \\ \dots\dots\dots \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_{n.10} \end{array} \right. \quad \text{— начальное условие}$$

**Определение.** Общим решением ДУ n-го порядка называется функция  $y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$  удовлетворяющая условиям:

1.  $y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$  — решение ДУ n-го порядка при любых  $C_1, C_2, \dots, C_n = const$
2. Какого бы ни было начальное условие, можно найти точки  $C_1^0, C_2^0, \dots, C_n^0$ , что функция  $y = \varphi(x, C_1^0, C_2^0, \dots, C_n^0)$  будет удовлетворять начальным условиям.

## 1.2 Сформулировать определение задачи Коши для ОДУ n-го порядка

**Определение.** Задача Коши для ДУ n-го порядка заключается в отыскании решения ДУ, удовлетворяющего начальному условию:

$$\left\{ \begin{array}{l} y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_{10} \\ y''(x_0) = y_{20} \\ \dots\dots\dots \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_{n.10} \end{array} \right.$$

Задача Коши = ДУ + начальное условие

## 1.3 Сформулировать определение линейного ОДУ n-го порядка

**Определение.** ДУ n-го порядка называется **линейным**, если неизвестная функция  $y(x)$  и её производные до n-го порядка включительно входят в уравнение в первой степени, не перемножаясь между собой.

$$\boxed{y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + p_2(x)y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = f(x)} \quad (1)$$

Если  $f(x) = 0, \forall x \in I$ , то ДУ (1) называется **линейным однородным ДУ** (ЛОДУ).

$$\boxed{y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + p_2(x)y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0} \quad (2)$$

(2) ЛОДУ n-го порядка

## 1.4 Сформулировать определение линейной зависимости и линейной независимости системы функций на промежутке

**Определение.** Система функций  $y_1(x), \dots, y_n(x)$  называется **линейно зависимой** на некотором промежутке  $I$ , если их линейная комбинация равна нулю, то есть

$$C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n = 0$$

при этом существует хотя бы один  $C_i \neq 0$ ,  $i = \overline{1, n}$ ,  $C_1, \dots, C_n - const$

**Определение.** Система функций  $y_1(x), \dots, y_n(x)$  называется **линейно независимой** на некотором промежутке  $I$ , если их линейная комбинация равна нулю, то есть

$$C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n = 0$$

где все  $C_i = 0$ ,  $i = \overline{1, n}$

## 1.5 Сформулировать определение определителя Вронского системы функций

**Определение.** **Определителем Вронского** (вронскианом) системы  $(n-1)$  раз дифференцируемых функций  $y_1(x), \dots, y_n(x)$  называется определитель вида:

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) & \dots & y_n(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) & \dots & y_n'(x) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_1^{(n-1)}(x) & y_2^{(n-1)}(x) & \dots & y_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}$$

## 1.6 Сформулировать определение фундаментальной системы решений линейного однородного ОДУ

Пусть дано ЛОДУ  $n$ -го порядка

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0 \quad (1)$$

**Определение.** **Фундаментальной системой решений ЛОДУ  $n$ -го порядка (1)** называется любая система линейно независимых частных решений ЛОДУ  $n$ -го порядка.

## 1.7 Сформулировать определение характеристического уравнения линейного ОДУ с постоянными коэффициентами

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = 0 \quad (1)$$

$$\boxed{k^n + a_1 k^{n-1} + \dots + a_{n-1} k + a_n = 0} \quad (2)$$

**Определение 1.** Уравнение (2) называется характеристическим уравнением. **Характеристическое уравнение** — это алгебраическое уравнение/полином/многочлен, полученный из ДУ (1) путём замены  $n$ -ой производной неизвестной функции  $y$  на  $n$ -ую степень величины  $k$ , а сама функция  $y$  заменена на единицу.

## 2 Теоретические вопросы, оцениваемые в 3 балла

### 2.1 Сформулировать и доказать теорему о вронскиане системы линейно зависимых функций

**Теорема** (О вронскиане линейно зависимых функций).

Если  $(n - 1)$  раз дифференцируемые функции  $y_1(x), \dots, y_n(x)$  линейно зависимы на некотором промежутке  $I$ , то

$$W(x) = 0, \quad \forall x \in I$$

**Доказательство.**

Так как  $y_1(x), \dots, y_n(x)$  линейно зависимы на  $I$ , то

$$\boxed{C_1 y_1(x), \dots, C_n y_n(x) = 0} \quad \exists C_i \neq 0, \quad i = \overline{1, n} \quad (*)$$

Продифференцируем (\*)  $(n - 1)$  раз:

$$\boxed{C_1 y_1'(x), \dots, C_n y_n'(x) = 0} \quad \exists C_i \neq 0, \quad i = \overline{1, n} \quad (**)$$

По определению линейной зависимости  $\Rightarrow y_1'(x), \dots, y_n'(x)$  — линейно зависимы

.....

$$\boxed{C_1 y_1^{(n-1)}(x), \dots, C_n y_n^{(n-1)}(x) = 0} \quad \exists C_i \neq 0, \quad i = \overline{1, n} \quad (***)$$

По определению линейной зависимости  $\Rightarrow y_1^{(n-1)}(x), \dots, y_n^{(n-1)}(x)$  — линейно зависимы

Составим систему из (\*), (\*\*) и (\*\*\*):

$$\begin{cases} C_1 y_1(x), \dots, C_n y_n(x) = 0 \\ C_1 y_1'(x), \dots, C_n y_n'(x) = 0 \\ \dots \dots \dots \\ C_1 y_1^{(n-1)}(x), \dots, C_n y_n^{(n-1)}(x) = 0 \end{cases}$$

Это однородная СЛАУ относительно  $C_1, \dots, C_n$ .



Дифференцируем  $(n - 1)$  раз функцию  $y = C_1y_1 + \dots + C_ny_n$ :

$$y'(x_0) = C_1y_1'(x_0) + \dots + C_ny_n'(x_0) = 0$$

$$y''(x_0) = C_1y_1''(x_0) + \dots + C_ny_n''(x_0) = 0$$

.....

$$y^{(n-1)}(x_0) = C_1y_1^{(n-1)}(x_0) + \dots + C_ny_n^{(n-1)}(x_0) = 0$$

Получили, что  $y = C_1y_1 + \dots + C_ny_n$  — решение ЛОДУ  $n$ -го порядка (2), удовлетворяющее начальному условию:

$$\begin{cases} y(x_0) = 0 \\ y'(x_0) = 0 \\ \dots\dots\dots \\ y^{(n-1)}(x_0) = 0 \end{cases}$$

Но  $y = 0$  — решение ЛОДУ (2), удовлетворяющее начальному условию (3)

По теореме  $\exists!$  решения задачи Коши для линейного дифференциального уравнения  $n$ -го порядка  $\Rightarrow$

$$y = C_1y_1 + \dots + C_ny_n = 0$$

при этом  $C_1, \dots, C_n$  — ненулевые константы  $\Rightarrow y_1, \dots, y_n$  — линейно зависимы по определению линейной зависимости. Это противоречит условию  $\Rightarrow$  предположение не является верным  $\forall x \in I: W(x) \neq 0$  ■

### 2.3 Сформулировать и доказать теорему о существовании фундаментальной системы решений линейного однородного ДУ $n$ -го порядка

**Утверждение.**

Если существует хотя бы одна точка  $x_0 \in I$ ,  $W(x_0) \neq 0$ , то система функций  $y_1(x), \dots, y_n(x)$  линейно независима.

Пусть дано ЛОДУ  $n$ -го порядка

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0 \tag{1}$$

**Теорема (О существовании ФСР ЛОДУ  $n$ -го порядка).**

Любое ЛОДУ  $n$ -го порядка (1) с непрерывными на промежутке  $I$  коэффициентами  $p_1(x), \dots, p_n(x)$  имеет ФСР, то есть систему из  $n$  линейно независимых функций.

**Доказательство.**

Рассмотрим ЛОДУ  $n$ -го порядка

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0$$

$p_1(x), \dots, p_n(x)$  — непрерывны на  $I$ .

Рассмотрим произвольный числовой определитель, отличный от нуля:

$$\begin{vmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \cdots & \gamma_{1n} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \cdots & \gamma_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \gamma_{n1} & \gamma_{n2} & \cdots & \gamma_{nn} \end{vmatrix} \neq 0 \quad \gamma_{ij} \in \mathbb{R}, \quad (ij) = \overline{1, n}$$

Возьмём  $\forall x_0 \in I$  и сформулируем для ЛОДУ  $n$ -го порядка задачи Коши, причём начальное условие в точке  $x_0$  для  $i$ -ой ЗК возьмём из  $i$ -го столбца определителя.

1 ЗК:

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0 - \text{ДУ}$$

$$\begin{cases} y(x_0) = \gamma_{11} \\ y'(x_0) = \gamma_{21} \\ \dots \dots \dots \\ y^{(n-1)}(x_0) = \gamma_{n1} \end{cases} - \text{начальное условие}$$

По теореме о существовании и единственности решения 1-ая задача Коши имеет единственное решение  $y_1(x)$ .

.....

n ЗК:

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0 - \text{ДУ}$$

$$\begin{cases} y(x_0) = \gamma_{1n} \\ y'(x_0) = \gamma_{2n} \\ \dots \dots \dots \\ y^{(n-1)}(x_0) = \gamma_{nn} \end{cases} - \text{начальное условие}$$

По теореме о существовании и единственности решения  $n$ -ая задача Коши имеет единственное решение  $y_n(x)$ .

Рассмотрим функции:

- $y_1$  — решение 1-ой ЗК
- $y_2$  — решение 2-ой ЗК
- .....
- $y_n$  — решение  $n$ -ой ЗК

Определитель Вронского функций  $y_1, \dots, y_n$ :

$$\begin{vmatrix} \gamma_1(x_0) & \gamma_2(x_0) & \cdots & \gamma_n(x_0) \\ \gamma_1'(x_0) & \gamma_2'(x_0) & \cdots & \gamma_n'(x_0) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \gamma_1^{(n-1)}(x_0) & \gamma_2^{(n-1)}(x_0) & \cdots & \gamma_n^{(n-1)}(x_0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \cdots & \gamma_{1n} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \cdots & \gamma_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \gamma_{n1} & \gamma_{n2} & \cdots & \gamma_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$$

По утверждению:  $\exists x_0 \in I: W(x_0) \neq 0 \Rightarrow y_1, \dots, y_n$  — линейно независимы  $\Rightarrow y_1, \dots, y_n$  образуют ФСР. ■

## 2.4 Сформулировать и доказать теорему о структуре общего решения линейного однородного ДУ $n$ -го порядка

**Теорема** (О структуре общего решения ЛОДУ  $n$ -го порядка).

Общим решением ЛОДУ  $n$ -го порядка

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0 \quad (1)$$

с непрерывными коэффициентами  $p_1(x), \dots, p_n(x)$  на промежутке  $I$  является линейная комбинация частных решений, входящих в ФСР.

$$y_{\text{оо}} = C_1 y_1 + \dots + C_n y_n \quad (2)$$

«оо» — общее решение однородного уравнения

$$y_1, \dots, y_n — \text{ФСР ЛОДУ (1), } C_1, \dots, C_n — \text{const}$$

**Доказательство.**

1) Покажем, что (2) решение ЛОДУ (1), но не общее. Для этого подставим (2) в (1):

$$\begin{aligned} (C_1 y_1 + \dots + C_n y_n)^{(n)} + p_1(x)(C_1 y_1 + \dots + C_n y_n)^{(n-1)} + \\ + \dots + \\ + p_{n-1}(x)(C_1 y_1 + \dots + C_n y_n)' + \\ + p_n(x)(C_1 y_1 + \dots + C_n y_n) = 0 \end{aligned}$$

Вычислим производные:

$$\begin{aligned} C_1 y_1^{(n)} + \dots + C_n y_n^{(n)} + p_1(x)C_1 y_1^{(n-1)} + \dots + p_1(x)C_n y_n^{(n-1)} + \\ + \dots + \\ + p_{n-1}(x)C_1 y_1' + \dots + p_{n-1}(x)C_n y_n' + \\ + p_n(x)C_1 y_1 + \dots + p_n(x)C_n y_n = 0 \end{aligned}$$

Группируем:

$$\begin{aligned} C_1 \overbrace{\left( y_1^{(n)} + p_1(x)y_1^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y_1' + p_n(x)y_1 \right)}^0 + \\ + \dots + \\ + C_n \underbrace{\left( y_n^{(n)} + p_1(x)y_n^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y_n' + p_n(x)y_n \right)}_0 = 0 \end{aligned}$$

Так как  $y_1, \dots, y_n$  — частные решения ЛОДУ (1), то:

$$\begin{aligned} C_1 \cdot 0 + \dots + C_n \cdot 0 = 0 \\ 0 = 0 \Rightarrow (2) — \text{решение (1)} \end{aligned}$$

2) Покажем, что (2) — это общее решение (1), то есть из него можно выделить един-

ственное частное решение, удовлетворяющее начальному условию:

$$\begin{cases} y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_{10} \\ y''(x_0) = y_{20} \\ \dots\dots\dots \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-10} \end{cases} \quad x_0 \in I \quad (3)$$

Подставим (2) в (3):

$$\begin{cases} y(x_0) = C_1 y_1(x_0) + \dots + C_n y_n(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = C_1 y_1'(x_0) + \dots + C_n y_n'(x_0) = y_{10} \\ y''(x_0) = C_1 y_1''(x_0) + \dots + C_n y_n''(x_0) = y_{20} \\ \dots\dots\dots \\ y^{(n-1)}(x_0) = C_1 y_1^{(n-1)}(x_0) + \dots + C_n y_n^{(n-1)}(x_0) = y_{n-10} \end{cases} \quad \text{— СЛАУ}$$

СЛАУ относительно  $C_1, \dots, C_n$ . Определитель этой системы — это определитель Вронского.

$$W(x_0) = \begin{vmatrix} y_1(x_0) & y_2(x_0) & \dots & y_n(x_0) \\ y_1'(x_0) & y_2'(x_0) & \dots & y_n'(x_0) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_1^{(n-1)}(x_0) & y_2^{(n-1)}(x_0) & \dots & y_n^{(n-1)}(x_0) \end{vmatrix}$$

так как  $y_1, \dots, y_n$  ФСР  $\Rightarrow y_1, \dots, y_n$  линейно независимы  $\Rightarrow W(x_0) \neq 0 \Rightarrow$  ранг расширенной матрицы СЛАУ совпадает с рангом основной матрицы  $\Rightarrow$  число неизвестных совпадает с числом уравнений  $\Rightarrow$  СЛАУ имеет единственное решение:

$$C_1^0, \dots, C_n^0$$

В силу теоремы о существовании и единственности решения задачи Коши:

$$y = C_1^0 y_1 + \dots + C_n^0 y_n \text{ — единственное решение ЗК (1), (3)}$$

То есть получилось из (2) выделить частное решение, удовлетворяющее начальному условию (3)  $\Rightarrow$  по определению общего решения (2) — общее решение ЛОДУ (2). ■

## 2.5 Сформулировать и доказать теорему о структуре общего решения линейного неоднородного ДУ $n$ -го порядка

**Теорема** (О структуре общего решения ЛНДУ).

Общее решение ЛНДУ (1) с непрерывными на промежутке  $I$  функциями  $p_1(x), \dots, p_n(x), f(x)$  равно сумме общего решения соответствующего ЛОДУ (2) и некоторого частного решения ЛНДУ (1).

$$\boxed{y_{\text{он}} = y_{\text{оо}} + y_{\text{чн}}} \quad (2)$$

- «оо» — общее решение однородного уравнения
- «чн» — частное решение неоднородного уравнения

**Доказательство.**

Сначала покажем, что (4) решение ЛНДУ (1), но не общее. Подставим (4) в (1):

$$(y_{\text{оо}} + y_{\text{чн}})^{(n)} + p_1(x)(y_{\text{оо}} + y_{\text{чн}})^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)(y_{\text{оо}} + y_{\text{чн}})' + p_n(x)(y_{\text{оо}} + y_{\text{чн}}) = f$$

Вычислим производные:

$$y_{\text{оо}}^{(n)} + y_{\text{чн}}^{(n)} + p_1(x)y_{\text{оо}}^{(n-1)} + p_1(x)y_{\text{чн}}^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y_{\text{оо}}' + p_{n-1}(x)y_{\text{чн}}' + p_n(x)y_{\text{оо}} + p_n(x)y_{\text{чн}} = f$$

Группируем  $y_{\text{оо}}$ ,  $y_{\text{чн}}$ :

$$\underbrace{y_{\text{оо}}^{(n)} + p_1(x)y_{\text{оо}}^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y_{\text{оо}}' + p_n(x)y_{\text{оо}}}_0 + \underbrace{y_{\text{чн}}^{(n)} + p_1(x)y_{\text{чн}}^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y_{\text{чн}}' + p_n(x)y_{\text{чн}}}_f = f$$

Так как  $y_{\text{оо}}$  — общее решение ЛОДУ (2),  $y_{\text{чн}}$  — частное решение ЛНДУ (1):

$$0 + f = f \Rightarrow f = f \Rightarrow (4) \text{ — решение ЛНДУ (1)}$$

По теореме о существовании и единственности решения задачи Коши следует, что ЗК (1), (3) имеет единственное решение.

Покажем, что (4) — общее решение. (4) переписется в виде:

$$y_{\text{он}} = C_1 y_1 + \dots + C_n y_n + y_{\text{чн}} \quad (4.1)$$

$y_1, \dots, y_n$  — ФСР ЛОДУ (2)  $C_1, \dots, C_n$  — const

Так как функции  $p_1(x), \dots, p_n(x), f(x)$  непрерывны на  $I$ , то по теореме о существовании и единственности решения задачи Коши  $\Rightarrow \exists$  единственное решение задачи Коши (1), (3).

Остаётся показать, что (4.1) и его производная удовлетворяют начальному условию (3), то есть из начального условия (3) единственным образом можно выделить константы  $C_1^0, \dots, C_n^0$ , то есть можно выделить частное решение.





## 2.7 Сформулировать и доказать свойства частных решений линейного однородного ДУ

### Теорема.

Множество частных решений ЛОДУ  $n$ -го порядка (2) с непрерывными функциями  $p_1(x), \dots, p_n(x)$  на промежутке  $I$  образует линейное пространство.

### Доказательство.

Пусть  $y_1$  и  $y_2$  — частные решения ЛОДУ  $n$ -го порядка (2). Тогда:

$$\begin{aligned} & y_1^{(n)} + p_1(x)y_1^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y_1' + p_n(x)y_1 = 0 \\ + & y_2^{(n)} + p_1(x)y_2^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y_2' + p_n(x)y_2 = 0 \end{aligned}$$

Складываем уравнения:

$$(y_1^{(n)} + y_2^{(n)}) + p_1(x)(y_1^{(n-1)} + y_2^{(n-1)}) + \dots + p_{n-1}(x)(y_1' + y_2') + p_n(x)(y_1 + y_2) = 0$$

По свойству производной:

$$(y_1 + y_2)^{(n)} + p_1(x)(y_1 + y_2)^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)(y_1 + y_2)' + p_n(x)(y_1 + y_2) = 0$$

Обозначим  $y = y_1 + y_2$ :

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + p_2(x)y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0$$

$y = y_1 + y_2$  — частное решение ЛОДУ (2).

Пусть  $y_1$  — частное решение ЛОДУ  $n$ -го порядка (2) Тогда:

$$\begin{aligned} & y_1^{(n)} + p_1(x)y_1^{(n-1)} + p_2(x)y_1^{(n-2)} + \dots + p_{n-1}(x)y_1' + p_n(x)y_1 = 0 \quad \Big| \cdot C = const, C \neq 0 \\ & C \cdot y_1^{(n)} + C \cdot p_1(x)y_1^{(n-1)} + \dots + C \cdot p_{n-1}(x)y_1' + C \cdot p_n(x)y_1 = 0 \\ & (Cy_1)^{(n)} + p_1(x)(Cy_1)^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)(Cy_1)' + p_n(x)(Cy_1) = 0 \end{aligned}$$

Обозначим  $y = Cy_1$ ,  $C = const, C \neq 0$ :

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0$$

↓

$$y = C \cdot y_1, \text{ где } C = const, C \neq 0 \quad \text{— решение ЛОДУ (2)}$$

По определению линейного пространства  $\Rightarrow$  частные решения ЛОДУ  $n$ -го порядка образуют линейное пространство. ■



## 2.8 Вывести формулу Остроградского - Лиувилля для линейного ОДУ 2-го порядка

Рассмотрим ЛОДУ 2-го порядка

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0 \quad (3)$$

Пусть  $y_1$  и  $y_2$  — два частных решения ЛОДУ (1). Для  $y_1$  и  $y_2$  верны равенства:

$$\begin{cases} y_1'' + p_1(x)y_1' + p_2(x)y_1 = 0 \\ y_2'' + p_1(x)y_2' + p_2(x)y_2 = 0 \end{cases} \begin{array}{l} \cdot (-y_2) \\ \cdot y_1 \end{array} \ll + \gg$$

$$y_1y_2'' - y_2y_1'' + p_1(x)(y_1y_2' - y_2y_1') + p_2(x)(y_1y_2 - y_1y_2) = 0 \quad (4)$$

Введём обозначение:

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1y_2' - y_1'y_2$$

$$(W(x))' = (y_1y_2' - y_2y_1')' = y_1'y_2'' + y_1y_2'' - y_1''y_2 - y_1'y_2' = y_1y_2'' - y_1''y_2$$

(2) примет вид:

$$W' + p_1(x) \cdot W = 0 \text{ ДУ с разделяющимися переменными}$$

$$W' = -p_1(x) \cdot W$$

$$\frac{dW}{dx} = -p_1(x) \cdot W \quad \left| : W \neq 0 \right| \cdot dx$$

$$\frac{dW}{W} = -p_1(x) dx$$

$$\ln |W| = - \int p_1(x) dx + C, \quad \forall C - const$$

$$e^{\ln |W|} = e^{- \int p_1(x) dx} \cdot e^C$$

$$|W| = e^{- \int p_1(x) dx} \cdot C_1, \quad \forall C_1 = e^C > 0$$

$$W = C_2 \cdot e^{- \int p_1(x) dx}, \quad \forall C_2 = \pm C_1 \neq 0$$

$W = 0$  — особое решение

$$W = C_3 \cdot e^{- \int p_1(x) dx}, \quad \forall C_3 - const$$

Формула Остроградского-Лиувилля

**Замечание.** Формула Остроградского-Лиувилля для ЛОДУ  $n$ -го порядка имеет тот же вид, что и для ЛОДУ 2-го порядка, где  $p_1(x)$  — коэффициент при  $(n - 1)$ -ой производной при условии, что коэффициент при  $n$ -ой производной равен 1.

**2.9 Вывести формулу для общего решения линейного однородного ДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами в случае простых действительных корней характеристического уравнения**

$$\boxed{y'' + a_1 y' + a_2 y = 0} \quad a_1, a_2 - const \quad \text{ЛОДУ} \quad (1)$$

$$\boxed{k^2 + a_1 k + a_2 = 0} \quad \text{характеристическое уравнение}$$

$$D = a_1^2 - 4a_2$$

$\boxed{1 \text{ случай}}$   $D > 0 \Rightarrow$  характеристическое уравнение имеет два действительных различных корня.

$$k_1 \neq k_2 \in \mathbb{R}$$

ФСР ЛОДУ (1):

$$\begin{cases} y_1 = e^{k_1 x} \\ y_2 = e^{k_2 x} \end{cases}$$

Покажем, что  $y_1$  и  $y_2$  линейно независимы, то есть образуют ФСР ЛОДУ (1):

$$W(X) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^{k_1 x} & e^{k_2 x} \\ k_1 e^{k_1 x} & k_2 e^{k_2 x} \end{vmatrix} = e^{(k_1+k_2)x} (k_2 - k_1)$$

$$\left. \begin{array}{l} e^{(k_1+k_2)x} \neq 0, \forall x \in I \\ k_2 - k_1 \neq 0, \text{ т.к. } k_2 \neq k_1 \end{array} \right\} \Rightarrow W(x) \neq 0 \Rightarrow \text{функции } y_1 = e^{k_1 x}, y_2 = e^{k_2 x} \text{ лин. независимы} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{ФСР ЛОДУ (1)}$$

По теореме о структуре общего решения ЛОДУ:

$$y_{00} = C_1 y_1 + C_2 y_2 = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x}$$

**2.10 Вывести формулу для общего решения линейного однородного ОДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами в случае комплексных корней характеристического уравнения**

$$\boxed{y'' + a_1 y' + a_2 y = 0} \quad a_1, a_2 - const \quad \text{ЛОДУ} \quad (1)$$

$$\boxed{k^2 + a_1 k + a_2 = 0} \quad \text{характеристическое уравнение}$$

$$D = a_1^2 - 4a_2$$

$D < 0 \Rightarrow$  характеристическое уравнение имеет комплексные корни.

$$k_{1,2} = \alpha \pm \beta \cdot i \quad i - \text{мнимая единица, } \sqrt{-1} = i$$

$\alpha$  — действительная часть       $\beta$  — мнимая часть

Формула Эйлера:

$$\begin{cases} e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi \\ e^{-i\varphi} = \cos \varphi - i \sin \varphi \end{cases}$$

По корням характеристического уравнения находим частные решения ЛОДУ (1).

$$k_1 = \alpha + \beta i:$$

$$y_1 = e^{k_1 x} = e^{(\alpha + \beta i)x} = e^{\alpha x} \cdot e^{\beta i x} = \boxed{e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x)}$$

$$k_2 = \alpha - \beta i:$$

$$y_2 = e^{k_2 x} = e^{(\alpha - \beta i)x} = e^{\alpha x} \cdot e^{-\beta i x} = \boxed{e^{\alpha x} (\cos \beta x - i \sin \beta x)}$$

Найдём действительные решения ЛОДУ (1). Составим линейные комбинации:

$$\tilde{y}_1 = \frac{y_1 + y_2}{2} = e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$\tilde{y}_2 = \frac{y_1 - y_2}{2i} = e^{\alpha x} \sin \beta x$$

Из свойств частных решений ЛОДУ следует (с.??), что  $\tilde{y}_1$  и  $\tilde{y}_2$  — тоже решения ЛОДУ (как линейная комбинация).

Покажем, что  $\tilde{y}_1$  и  $\tilde{y}_2$  линейно независимы:

$$\begin{aligned} W(x) &= \begin{vmatrix} \tilde{y}_1 & \tilde{y}_2 \\ \tilde{y}_1' & \tilde{y}_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^{\alpha x} \cos \beta x & e^{\alpha x} \sin \beta x \\ \alpha e^{\alpha x} \cos \beta x - \beta e^{\alpha x} \sin \beta x & \alpha e^{\alpha x} \sin \beta x + \beta e^{\alpha x} \cos \beta x \end{vmatrix} = \\ &= \alpha e^{2\alpha x} \cos \beta x \sin \beta x + \beta e^{2\alpha x} \cos^2 \beta x - \alpha e^{2\alpha x} \cos \beta x \sin \beta x + \beta e^{2\alpha x} \sin^2 \beta x = \\ &= e^{2\alpha x} \beta \cdot 1 \neq 0 \quad \text{т.к. } e^{2\alpha x} \neq 0 \quad \forall x \in I \end{aligned}$$

$\beta \neq 0$ , так как если  $\beta = 0$ , то  $k_1 = k_2 = \alpha$  — действительные корни

$$\Rightarrow \left. \begin{matrix} \tilde{y}_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x \\ \tilde{y}_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x \end{matrix} \right\} \text{ линейно независимы } \Rightarrow \text{ФСР}$$

По теореме о структуре решений ЛОДУ (Т.??):

$$y_{\text{oo}} = C_1 y_1 + C_2 y_2 = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

## 2.11 Вывести формулу для общего решения линейного однородного ОДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами в случае кратных корней характеристического уравнения

$$\boxed{y'' + a_1 y' + a_2 y = 0} \quad a_1, a_2 - \text{const} \quad \text{ЛОДУ} \quad (1)$$

$$\boxed{k^2 + a_1 k + a_2 = 0} \quad \text{характеристическое уравнение}$$

$$D = a_1^2 - 4a_2$$

$D = 0 \Rightarrow$  характеристическое уравнение имеет два действительных равных между собой корня / один корень кратности два.

$$\begin{aligned} k_1 = k_2 = k \in \mathbb{R} \\ y_1 = e^{kx} \quad k = -\frac{a_1}{2} \end{aligned}$$

Найдём  $y_2$  — частное решение ЛОДУ (1) по известному частному решению  $y_1$ , причём  $y_1$  и  $y_2$  линейно независимы:

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 \int \frac{1}{y_1^2} \cdot e^{-\int p_1(x) dx} dx = \left| \begin{matrix} p_1(x) = a_1 - \text{const} \\ y_1 = e^{kx}, k \in \mathbb{R} \end{matrix} \right| = e^{kx} \int \frac{1}{e^{2kx}} \cdot e^{-\int a_1 dx} = \\ &= e^{-\frac{a_1}{2}x} \int \frac{1}{e^{-a_1 x}} \cdot e^{-a_1 x} dx = e^{-\frac{a_1}{2}x} \int dx = e^{-\frac{a_1}{2}x} x \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} y_1 &= e^{-\frac{a_1}{2}x} \\ y_2 &= xe^{-\frac{a_1}{2}x} \end{aligned} \right\} \text{два частных решения ЛОДУ (1)}$$

Покажем, что  $y_1$  и  $y_2$  линейно независимы:

$$\begin{aligned} W(x) &= \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^{-\frac{a_1}{2}x} & xe^{-\frac{a_1}{2}x} \\ -\frac{a_1}{2}e^{-\frac{a_1}{2}x} & e^{-\frac{a_1}{2}x} - \frac{a_1}{2}xe^{-\frac{a_1}{2}x} \end{vmatrix} = e^{-a_1x} - \frac{a_1}{2}xe^{-a_1x} + \frac{a_1}{2}xe^{-a_1x} = \\ &= e^{-a_1x} \neq 0, \forall x \in I \Rightarrow y_1, y_2 \text{ лин. нез.} \Rightarrow \text{образуют ФСР} \end{aligned}$$

ФСР ЛОДУ (1):

$$\begin{cases} y_1 = e^{-\frac{a_1}{2}x} \\ y_2 = xe^{-\frac{a_1}{2}x} \end{cases}$$

По теореме о структуре общего решения ЛОДУ (Т.??):

$$y_{\text{оо}} = C_1y_1 + C_2y_2 = C_1e^{-\frac{a_1}{2}x} + C_2xe^{-\frac{a_1}{2}x}$$

## 2.12 Описать метод Лагранжа вариации произвольных постоянных для линейного неоднородного ОДУ 2-го порядка и вывести систему соотношений для варьируемых переменных

Рассмотрим ЛНДУ 2-го порядка

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = f(x) \quad (5)$$

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0 \quad \text{ЛОДУ} \quad (6)$$

$p_1(x), \dots, p_n(x)$  — функции.

Пусть  $y_1$  и  $y_2$  — это ФСР ЛОДУ (2). Тогда по теореме о структуре общего решения ЛОДУ (Т.??):

$$y_{\text{оо}} = \underbrace{C_1y_1 + C_2y_2}_{\text{ФСР ЛОДУ}} \quad C_1, C_2 = \forall \text{const}$$

Метод Лагранжа: предполагаемый вид решения ЛНДУ (1):

$$y_{\text{он}} = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2 \quad (7)$$

$C_1(x), C_2(x)$  — некоторые функции.

Вычислим:

$$y'_{\text{он}} = C_1'y_1 + C_1y_1' + C_2'y_2 + C_2y_2' = \underbrace{C_1'y_1 + C_2'y_2}_0 + C_1y_1' + C_2y_2'$$

**Первое дополнительное условие Лагранжа:**

$$\boxed{C_1'y_1 + C_2'y_2 = 0}$$

$$\begin{aligned} y'_{\text{он}} &= C_1y_1' + C_2y_2' \\ y''_{\text{он}} &= C_1'y_1' + C_1y_1'' + C_2'y_2' + C_2y_2'' \end{aligned}$$

$y_{\text{оН}}, y'_{\text{оН}}, y''_{\text{оН}}$  в (1):

$$C'_1 y'_1 + C_1 y''_1 + C'_2 y'_2 + C_2 y''_2 + p_1(x) \cdot (C_1 y'_1 + C_2 y'_2) + p_2(x)(C_1 y_1 + C_2 y_2) = f$$

Группируем:

$$C'_1 y'_1 + C'_2 y'_2 + C_1 \underbrace{(y''_1 + p_1(x)y'_1 + p_2(x)y_1)}_0 + C_2 \underbrace{(y''_2 + p_1(x)y'_2 + p_2(x)y_2)}_0 = f$$

Так как  $y_1, y_2$  — решения ЛОДУ (2), то

**Второе условие Лагранжа:**

$$\boxed{C'_1 y'_1 + C'_2 y'_2 = f}$$

Предполагаемое решение (3) будет являться решением ЛНДУ (1), если функции  $C_1(x)$  и  $C_2(x)$  удовлетворяют условиям:

$$\begin{cases} C'_1 y_1 + C'_2 y_2 = 0 \\ C'_1 y'_1 + C'_2 y'_2 = f \end{cases} \text{ — система варьируемых переменных}$$

Определяем из системы варьируемых переменных  $C'_1(x)$  и  $C'_2(x)$ .

$$C'_1(x) = \varphi(x) \quad C'_2(x) = \Psi(x)$$

Интегрируем:

$$\begin{aligned} C_1(x) &= \int \varphi(x) dx + k_1, \quad \forall k_1 - const \\ C_2(x) &= \int \Psi(x) dx + k_2, \quad \forall k_2 - const \end{aligned}$$

Подставляем  $C_1(x), C_2(x)$  в (3):

$$\begin{aligned} y_{\text{оН}} &= C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2 = \left( \int \varphi(x) dx + k_1 \right) y_1 + \left( \int \Psi(x) dx + k_2 \right) y_2 = \\ &= \underbrace{k_1 y_1 + k_2 y_2}_{y_{\text{оо}}} + \underbrace{y_1 \int \varphi(x) dx + y_2 \int \Psi(x) dx}_{y_{\text{чн}}} \end{aligned}$$

Система варьируемых переменных имеет единственное решение, так как определитель — это определитель Вронского.

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix} \neq 0 \quad \text{т.к. } y_1 \text{ и } y_2 \text{ ФСР ЛОДУ}$$